

Prova Trimestral Substitutiva 4º trimestre - ME 1

1 - Durante uma parada cardiorrespiratória (PCR) e reanimação:

Questões	Resposta:
A) a amiodarona deve ser administrada imediatamente após o primeiro choque.	Falso
B) a segunda dose de amiodarona deve ser de 300 miligramas.	Falso
C) em fibrilação ventricular, o primeiro choque deve ser após a primeira dose de adrenalina.	Falso
D) na PCR em assistolia do adulto, a dose de adrenalina devem ser de 10 µg.kg ⁻¹ .	Falso
E) a carga inicial do choque com desfibrilador bifásico deve ser de 360 joules.	Falso

2 - Paciente do sexo feminino, 85 anos, 160cm e 50kg foi submetida a toracotomia para segmentectomia pulmonar sob anestesia geral e epidural contínua. Evolui 48h após a cirurgia com paraplegia. Sobre este caso responda:

Questões	Resposta:
A) idade avançada e sexo feminino são fatores de risco para ocorrência de hematoma epidural neste caso.	Verdadeiro
B) a tomografia computadorizada é o método de diagnóstico por imagem de escolha para situações de emergência pois permite uma avaliação rápida e não invasiva da coluna vertebral e da medula em todos os planos.	Falso
C) caso haja distúrbio de coagulação subjacente, a opção terapêutica mais indicada é o tratamento clínico conservador.	Falso
D) a recuperação neurológica completa é improvável quando o intervalo entre o desenvolvimento da paralisia e o tratamento definitivo for maior que 2h.	Falso
E) o principal fator de risco para ocorrência de hematoma epidural é a presença de distúrbio de coagulação.	Verdadeiro

3 - Com relação ao risco de aspiração pulmonar perioperatória, julgue os itens:

Questões	Resposta:
A) A neostigmina aumenta o tônus do esfíncter esofágico inferior.	Verdadeiro
B) A presença de sonda nasogástrica é fator de risco.	Verdadeiro
C) A motilina está reduzida no primeiro trimestre da gestação.	Falso
D) Deve-se evitar o uso de pressão contínua nas vias aéreas no caso de lesão pulmonar grave.	Falso
E) O cefalodeclive reduz a possibilidade de aspiração no caso de regurgitação de conteúdo gástrico.	Verdadeiro

4 - Julgue:

Questões	Resposta:
A) Apesar dos avanços farmacológicos e médicos na última década, a incidência de complicações pós-operatórias na unidade de cuidados pós-anestesia permaneceu em grande parte inalterada.	Verdadeiro
B) A obstrução das vias aéreas superiores é uma complicação rara no período pós-operatório	Falso
C) A retenção urinária e oligúria na sala de recuperação são mais comumente causadas por problemas renais intrínsecos.	Falso
D) A perda de patência faríngea e a consequente obstrução das vias aéreas são comuns em pacientes pós-operatórios com obesidade e apneia obstrutiva do sono.	Verdadeiro
E) Náuseas e vômitos pós-operatórios são mais comuns em idosos que em pacientes jovens.	Falso

5 - Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA):

Questões	Resposta:
A) a complicação mais comum é hipoxemia.	Falso
B) idade > 40 anos e peso > 120kg são fatores de risco para dessaturação de oxigênio em pacientes respirando em ar ambiente transportados para a SRPA.	Falso
C) deficiência auditiva é fator de risco para delirium pós-operatório.	Verdadeiro
D) deficiência visual é fator de risco para delirium pós-operatório.	Verdadeiro
E) laringoespasma é causa de edema pulmonar por pressão negativa.	Verdadeiro