

Prova Trimestral Substitutiva 4º trimestre - ME 2

1 - Sobre anestesia ambulatorial:

Questões		Resposta:
A)	apneia do sono contraindica a realização de procedimentos em regime ambulatorial.	Falso
B)	a alta hospitalar em regime ambulatorial deve ser dada pelo médico anesthesiologista ou pelo cirurgião ou por médicos por eles designados.	Verdadeiro
C)	lactente com menos de 6 meses de idade que tenha irmão com história de morte súbita na infância é um fator limitante para procedimentos ambulatoriais.	Verdadeiro
D)	unidade ambulatorial do tipo I é o local destinado à realização de procedimentos clínicos ou diagnósticos, sob anestesia local, em dose inferior a 5,5 mg/kg de lidocaína (ou dose equipotente de outros anestésicos locais) sem necessidade de internação.	Falso
E)	segundo a resolução do conselho federal de medicina 1886/2008 é responsabilidade do médico anesthesiologista que a unidade de saúde com internação de curta permanência cumpra as normas estabelecidas visando o bem-estar e a segurança do paciente.	Falso

2 - Nas cirurgias videolaparoscópicas:

Questões		Resposta:
A)	gás hélio e argônio são altamente solúveis, fisicamente inertes e não explosivos	Falso
B)	as alterações cardiocirculatórias, renais, respiratórias e endócrinas estão diretamente associadas ao aumento da pressão intra-abdominal.	Verdadeiro
C)	o aumento da pressão intra-abdominal leva a aumento da resistência vascular e da pós-carga e diminui o débito cardíaco.	Verdadeiro
D)	o pneumoperitônio leva a diminuição da pré-carga o que contribui para a redução do débito cardíaco.	Verdadeiro
E)	com o deslocamento cefálico do diafragma ocorre atelectasia das bases pulmonares, aumento da capacidade vital e do espaço morto.	Falso

3 - No manuseio anestésico-cirúrgico nas microcirurgias da laringe com laser:

Questões		Resposta:
A)	há maior risco de incêndio nas vias aéreas com uma fração inspirada de oxigênio superior a 60%.	Verdadeiro
B)	todas as estruturas anatômicas adjacentes à lesão devem ser recobertas com gases umidificadas com soro fisiológico para evitar incêndio nas vias aéreas.	Falso
C)	há maior efeito hemostático na lesão quando é usado o laser ND:YAG.	Verdadeiro
D)	danos teciduais profundos adjacentes à lesão são mais frequentes quando o laser é de CO ₂ .	Falso
E)	para amenizar o turbilhonamento de ar na ventilação, um aumento no tempo inspiratório torna a insuflação do volume corrente mais lento.	Verdadeiro

4 - Sobre as particularidades da anestesia para oftalmologia:

Questões		Resposta:
A)	o reflexo oculocardíaco tem como via aferente os nervos ciliares curtos e como via eferente o nervo vago.	Verdadeiro
B)	a hipercarbúria e a hipóxia aumentam a pressão intraocular.	Verdadeiro
C)	o uso crônico da acetazolamida está associado à alcalose metabólica e hiperpotassemia.	Falso
D)	a absorção sistêmica de fenilefrina tópica produz hipertensão e bradicardia.	Verdadeiro
E)	a pilocarpina é um fármaco simpaticomimético cujo uso crônico está associado à hipertensão e broncodilatação.	Falso

5 - Dos estabelecimentos de saúde que realizam procedimentos de curta permanência:

Questões		Resposta:
A)	a unidade tipo III é anexada a um hospital geral ou especializado e que pode utilizar a estrutura do hospital.	Falso
B)	a unidade tipo II tem obrigatoriedade de garantir a referência para um hospital de apoio.	Verdadeiro
C)	a unidade tipo I deverá contar com salas de recuperação ou de observação do paciente.	Falso
D)	na unidade tipo IV não está prevista a internação do paciente por mais de 24horas.	Verdadeiro
E)	a unidade tipo I realiza anestesia locorregional, com ou sem sedação.	Falso