

Prova Trimestral Substitutiva 1º Trimestre - ME 3

1 - Sobre disfunção tireoideana perioperatória:

Questões	Resposta:
A) o aumento do hormônio estimulante da tireoide (TSH) é o indicador mais sensível do hipotireoidismo.	Verdadeiro
B) a secreção do hormônio liberador de tireotrofina (TRH) modula a produção de TSH, sendo ambos regulados positivamente pelo T4 e pelo T3.	Falso
C) anemia, trombocitopenia, aumento da fosfatase alcalina, hipercalcemia, perda de massa muscular e perda óssea ocorrem no hipotireoidismo.	Falso
D) propiltiouracil e metimazol diminuem a síntese de T4 e reduzem os níveis de anticorpo do receptor de TSH.	Verdadeiro
E) o hipertireoidismo associado à amiloidose causa alargamento da língua, anormalidades do sistema de condução cardíaca e doença renal.	Falso

2 - Com relação ao atendimento anestésico do paciente vítima de trauma:

Questões	Resposta:
A) a hemorragia é a segunda causa mais comum de óbito após o trauma.	Verdadeiro
B) o uso de cetamina é uma opção na intubação traqueal de paciente hipotenso com trauma ocular aberto.	Falso
C) a administração de concentrado de hemácias é fator de risco independente para mortalidade e permanência hospitalar prolongada.	Verdadeiro
D) uma das metas do tratamento inicial do paciente vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE) é manter a pressão de perfusão cerebral acima de 70mmHg.	Falso
E) o eletrocardiograma é o melhor teste de triagem no diagnóstico de contusão miocárdica.	Verdadeiro

3 - Sobre a técnica de infiltração tumescente:

Questões	Resposta:
A) é utilizada principalmente por ortopedistas.	Falso
B) doses de lidocaína entre 35 e 55mg/kg levam a concentrações próximas ou abaixo de 5µg/ml.	Verdadeiro
C) a depender do sítio de infiltração, o pico plasmático demora cerca de 20 horas após a injeção.	Verdadeiro
D) utiliza doses elevadas de anestésicos e é associada a alto risco de complicações graves.	Falso
E) é comum associar epinefrina à solução.	Verdadeiro

4 - Com relação à anestesia para cirurgia bucomaxilofacial:

Questões	Resposta:
A) intubação nasal é contraindicada em fraturas Le Fort classe II.	Verdadeiro
B) fratura complexa do arco zigomático-maxila é classificada como Le Fort III.	Falso
C) intubação submentoniana é uma alternativa segura e efetiva à intubação nasal.	Verdadeiro
D) a osteotomia maxilar durante cirurgia ortognática tem como complicação cortar o tubo traqueal.	Verdadeiro
E) laceração da parede anterior faringe e falso trajeto nasofaríngeo são complicações de intubação nasal durante cirurgia ortognática.	Falso

5 - Sobre anestesia em procedimentos torácicos:

Questões	Resposta:
A) a necessidade de ventilação monopulmonar é maior na cirurgia torácica videoassistida do que na toracotomia aberta.	Verdadeiro
B) em pacientes com doença restritiva, como fibrose pulmonar e escoliose, há uma diminuição da Capacidade Vital Forçada (CVF) com um Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1) aumentado.	Falso
C) uma melhora de 15% nos testes de função pulmonar após terapia broncodilatadora é considerada uma resposta positiva e indica que esta terapia deve ser iniciada antes da cirurgia.	Verdadeiro
D) pacientes que vão ser submetidos a ressecção pulmonar e apresentam consumo máximo de oxigênio (VO ₂ máx) maior que 15 a 20 mL/kg/min estão em risco reduzido de complicação pós-operatória.	Verdadeiro
E) são indicações da utilização de bloqueadores endobrônquicos os pacientes com traqueostomia e aqueles em que a intubação deve ser realizada pela via nasal.	Verdadeiro