

Prova Trimestral Substitutiva 3º Trimestre - ME 3

1 - Sobre anestesia pediátrica.

Questões		Resposta:
A)	A função renal é aumentada em recém-nascidos como resultado de seu maior percentual de água, em comparação ao adulto.	Falso
B)	Ao nascimento, o pH gástrico é alcalino.	Verdadeiro
C)	Os bebês são especialmente vulneráveis à hipotermia devido a baixa proporção da área de superfície corporal em relação ao peso.	Falso
D)	Desfechos anestésicos básicos como dor, memória e inconsciência são difíceis de avaliar em bebês.	Verdadeiro
E)	A dose necessária para administração intravenosa de succinilcolina em lactentes (2,0 mg/kg) é aproximadamente o dobro das crianças mais velhas (1,0 mg/kg).	Verdadeiro

2 - Sobre anestesia para transplantes:

Questões		Resposta:
A)	Isoflurano, sevoflurano e desflurano afetam a função renal pós-transplante de fígado.	Falso
B)	Nos pacientes com morte cerebral apesar de terem reflexos espinhais intactos, não é necessário o uso de bloqueio neuromuscular durante a obtenção de órgãos.	Falso
C)	A doença cardíaca isquêmica é a principal causa de morte em transplantados renais, em parte devido à doença subjacente que precedeu o transplante.	Verdadeiro
D)	Doenças cardíacas, pulmonares, hepáticas e infecções ativas ou intratáveis, como tuberculose são critérios de exclusão para transplante renal.	Verdadeiro
E)	Pontuação MELD para escolha de pacientes para transplante de fígado utilizados para o cálculo: creatinina, bilirrubina, TGO, TGP e sódio, valores acima de 35 são elegíveis para o transplante.	Falso

3 - Em procedimentos de Ressonância Nuclear Magnética:

Questões		Resposta:
A)	Frações inspiradas de oxigênio a 100% garantem a não geração de artefatos durante o exame.	Falso
B)	É recomendado que se responda a um questionário sobre segurança além da passagem por equipamentos detectores de metais antes da entrada na sala de procedimentos.	Verdadeiro
C)	Metais considerados seguros na sala de ressonância magnética incluem: aço inoxidável, titânio, alumínio, cobre.	Verdadeiro
D)	Pacientes portadores de cliques vasculares ferrosos devem ser excluídos de procedimentos de ressonância magnética.	Verdadeiro
E)	O aparelho de anestesia e monitor devem ser construídos em alumínio, aço não magnético, plástico ou latão quando forem alocados adjacentes ao magneto.	Verdadeiro

4 - Em relação aos agonistas opioides utilizados em analgesia pós-operatória, sabe-se:

Questões		Resposta:
A)	A potência analgésica e a duração da analgesia da morfina é em grande parte devido ao seu metabólito morfina 3-glucoronídeo (M3G)	Falso
B)	Metadona é um analgésico de longa duração indicado nos adictos a opioides que estão em recuperação.	Verdadeiro
C)	Metadona é segura nos pacientes com intervalos QT maiores ou iguais a 500 milissegundos no ECG.	Falso
D)	O tramadol pelo seu mecanismo de ação, tem efeitos analgésicos e antidepressivos.	Verdadeiro
E)	A codeína é segura em analgesia em crianças.	Falso

5 - Com relação às particularidades do recém-nascido prematuro:

Questões		Resposta:
A)	a produção de surfactante pelos pneumócitos tipo 2 ocorre entre a 32 ^a e 36 ^a semana gestacional.	Verdadeiro
B)	ocorre disfunção diastólica devido à recaptção limitada de cálcio ao término da sístole.	Verdadeiro
C)	a hemorragia intracraniana é uma complicação, cuja incidência é diretamente proporcional à idade gestacional.	Falso
D)	a hemoglobina fetal apresenta alta concentração de 2,3-DPG.	Falso
E)	os fatores de coagulação V, VIII, XIII e o fibrinogênio estão reduzidos ao nascimento.	Falso