

Prova Trimestral - 4º TR - ME 2**1- Com relação a procedimentos ambulatoriais, analise as alternativas:**

Questões	Resposta:
A) paciente de 70 Kg encaminhado para retirada de lesões de pele sendo utilizado 210 mg de lidocaína com vasoconstritor, está autorizada a realização em unidade tipo I.	Verdadeiro
B) nas unidades tipo II, a presença de salas de recuperação é opcional, é contraindicada a realização de anestesia no neuroeixo sendo permitido procedimentos de pequeno e médio porte sob anestesia locorregional.	Falso
C) tanto nas unidades tipo III e IV o tempo de internação deve ser até 24 horas, porém nas unidades III são utilizadas estruturas de apoio do hospital como lavanderia, central de esterilização.	Falso
D) criança com 3 meses de idade, nasceu com 30 semanas, encaminhada para realização de sondagem de vias lacrimais em regime ambulatorial. Sua conduta deve ser encaminhar para procedimento com internação devido ao risco de apnéia.	Verdadeiro
E) em pacientes idosos e estado físico ASA III, desde que estejam as doenças preexistentes adequadamente controladas, são permitidos procedimentos em caráter ambulatorial.	Verdadeiro

2- Um paciente de 45 anos, com índice de massa corporal (IMC) de 32 kg/m² e histórico de hipertensão controlada, foi submetido a uma cirurgia de videocolecistectomia laparoscópica. Durante o procedimento, foi insuflado dióxido de carbono (CO₂) para criar um pneumoperitônio com pressão intra-abdominal de 12 mmHg. Após a cirurgia, a equipe médica monitorou cuidadosamente a função renal e hemodinâmica do paciente devido ao risco de complicações associadas ao pneumoperitônio. Sobre os efeitos fisiológicos do pneumoperitônio:

Questões	Resposta:
A) o pneumoperitônio com CO ₂ aumenta a resistência vascular sistêmica (SVR) e a resistência vascular pulmonar (PVR), e pode causar uma diminuição no débito cardíaco.	Verdadeiro
B) a insuflação de CO ₂ durante a laparoscopia está associada a uma absorção mais rápida de bolhas intravasculares em comparação com gases como nitrogênio, argônio ou hélio.	Verdadeiro
C) a perfusão renal e a função renal podem ser prejudicadas pelo pneumoperitônio, sendo esses efeitos permanentes.	Falso
D) em pacientes obesos mórbidos, o pneumoperitônio pode ter um efeito hemodinâmico menos pronunciado em comparação com pacientes não obesos.	Verdadeiro
E) o uso de ventilação por jato de alta frequência (HFJV) é a melhor prática para minimizar os efeitos adversos do pneumoperitônio.	Falso

3- Sobre a analgesia pós-operatória de amigdalectomia:

Questões	Resposta:
A) bloqueios dos nervos palatino maior e palatino menor possibilitam analgesia de forma mais segura que a injeção com anestésico local na loja amigdaliana.	Verdadeiro
B) a codeína está indicada na analgesia pós-operatória das crianças.	Falso
C) a morfina é o analgésico de escolha na analgesia pós-operatória de crianças.	Falso
D) a dexametasona intravenosa além do efeito antiemético, reduz intensidade da dor.	Verdadeiro
E) o paracetamol é indicado com segurança nos pacientes que utilizam fármacos indutores do sistema P450.	Falso

4- Em relação ao reflexo oculocardíaco, analise as afirmativas abaixo:

Questões		Resposta:
A)	os impulsos aferentes originam-se no conteúdo orbitário, seguem pelos nervos ciliares curtos, passam pelo gânglio ciliar, que é divisão oftálmica do nervo trigêmeo.	Verdadeiro
B)	na ocorrência do reflexo, os impulsos eferentes são conduzidos através do nervo vago ao coração.	Verdadeiro
C)	injeção intraconal, é um bloqueio anestésico capaz de ativar o reflexo oculocardíaco.	Verdadeiro
D)	analisando as cirurgias oftalmológicas, o reflexo é mais frequente e intenso em cirurgias para correção do estrabismo, inclusive ocorre em pacientes anestesiados.	Verdadeiro
E)	febre e a hipercarbia, são fatores de risco para aumento da incidência do reflexo oculocardíaco.	Verdadeiro

5- Sobre anestesia ambulatorial:

Questões		Resposta:
A)	unidades tipo II destinam-se à realização cirurgias/procedimentos de pequeno e médio porte, sob anestesia locorregional (com exceção dos bloqueios subaracnóideo e peridural), com ou sem sedação.	Verdadeiro
B)	a alta do serviço será dada por qualquer membro da equipe médica responsável.	Verdadeiro
C)	uma vez liberados para o regime ambulatorial, prematuros saudáveis devem permanecer sob vigilância pelo período mínimo de 6 horas.	Verdadeiro
D)	crianças portadoras de cardiopatias congênitas não podem ser submetidas a cirurgias em regime ambulatorial.	Falso
E)	a recuperação do estágio III dá-se quando o paciente está apto a se levantar e andar sem ajuda. Os efeitos colaterais devem estar ausentes e a realimentação deve ser instituída com sucesso.	Verdadeiro