

Prova Trimestral Substitutiva 1º Trimestre - ME1**1- Sobre a ética aplicada à prática do anestesiológico, responda:**

Questões		Resposta:
A)	a premissa da ética baseada na teoria deontológica quando aplicada à medicina considera que a intenção é mais importante que o resultado.	Verdadeiro
B)	situações que exijam procedimentos cirúrgicos em caráter de urgência desobrigam a necessidade da aplicação do TCLE.	Falso
C)	as mulheres em trabalho de parto são capazes de dar consentimento informado.	Verdadeiro
D)	a teoria ética deontológica ("baseada em regras") e a teoria utilitarista (baseada em resultados) entram em conflito em cenários clínicos nos quais os interesses de pacientes individuais são confrontados com os interesses de populações maiores	Verdadeiro
E)	instituição de cuidados paliativos exige suporte aos familiares, respeito pela autonomia, crenças religiosas e culturais do paciente, bem como capacidade de se comunicar de forma empática e eficaz.	Verdadeiro

2- Com relação à estrutura e relações institucionais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), avalie:

Questões		Resposta:
A)	os Departamentos da SBA são órgãos cujas responsabilidade e supervisão competem a todos os diretores.	Falso
B)	atualmente, a SBA possui 25 regionais.	Verdadeiro
C)	compete ao Conselho Superior deliberar sobre os casos omissos no Estatuto da SBA.	Falso
D)	compete à Diretoria convocar uma Assembleia Geral Extraordinária quando solicitada por maioria simples dos seus membros.	Falso
E)	compete à Diretoria deliberar sobre o credenciamento e descredenciamento dos Centros de Ensino e Treinamento.	Verdadeiro

3- Com relação ao risco profissional do anestesiológico:

Questões		Resposta:
A)	o anestesiológico é rotineiramente exposto tanto a radiação eletromagnética ionizantes quanto não ionizante. O primeiro é principalmente de lasers e o último principalmente de raios X.	Falso
B)	bisturis elétricos ou ultrassônicos podem produzir nuvem de fumaça contendo células viáveis, tais como substâncias bacterianas, virais e cancerígenas.	Verdadeiro
C)	a incidência de abuso de álcool entre anestesistas é a mesmo que no geral população, 1% a 2%.	Falso
D)	varicela, rubéola e tuberculose são doenças de transmissão aérea, ou seja, a partir da inalação de aerossóis. Logo, profissionais de saúde devem usar máscaras N95 ou superiores.	Verdadeiro
E)	o fármaco mais comumente abusado como drogadição pelos anestesistas tem sido a cetamina, conforme indicado em vários estudos.	Falso

4- Sobre avaliação e preparo pré-anestésico:

Questões		Resposta:
A)	a terapia de ponte com heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada intravenosa é geralmente necessária após a interrupção dos anticoagulantes orais diretos devido às suas meias-vidas relativamente longas.	Falso
B)	pacientes com insuficiência renal significativa (taxa de filtração glomerular estimada < 30 mL/min) devem preferencialmente receber heparina não fracionada intravenosa como terapia de ponte.	Verdadeiro
C)	os antagonistas da vitamina K, como a varfarina, devem ser interrompidos 10 dias antes da cirurgia.	Falso
D)	o escore MELD é calculado usando a concentração sérica de bilirrubina, INR e concentrações séricas de creatinina.	Verdadeiro
E)	fenoxibenzamina é um bloqueador α -adrenérgico reversível e de ação prolongada, é frequentemente usado na preparação pré-operatória para feocromocitoma.	Falso

5- Sobre os dispositivos supra-glóticos (DSG):

Questões		Resposta:
A)	são dispositivos que isolam as vias aéreas acima das cordas vocais.	Verdadeiro
B)	o risco de laringoespasma aumentado e saturação de oxigênio mais baixa, após a remoção do dispositivo de vias aéreas, são desvantagem da utilização da máscara laríngea na cirurgia supraglótica.	Falso
C)	diferente da intubação traqueal, o uso dos DSG não induz o surgimento de disfagia pós-operatória.	Falso
D)	o tubo laríngeo consiste em um tubo de lúmen único com balonetes distal e proximal, de baixa pressão, que são inflados por meio de uma válvula piloto comum.	Verdadeiro
E)	são contraindicados em cenários clínicos com risco aumentado de regurgitação, alta resistência das vias aéreas, obstrução glótica ou subglótica e abertura bucal limitada (<1,5 cm).	Verdadeiro