

Prova Trimestral Substitutiva 2º Trimestre – ME3**1- Sobre o manuseio do paciente em cirurgia cardíaca:**

Questões		Resposta:
A)	em implante de valva aórtica transcaterter (TAVI), a indução de taquicardia ventricular com marca passo se faz necessário para a abertura da prótese.	Verdadeiro
B)	ecocardiografia é imprescindível para confirmar a ausência de contração ventricular na técnica na TAVI.	Verdadeiro
C)	complexo protrombínico reverte coagulopatia decorrente da varfarina.	Verdadeiro
D)	desmopressina trata a disfunção plaquetária na doença de Von Willebrand tipo 1 e adquirida.	Verdadeiro
E)	os cumarínicos devem ser suspenso cinco dias antes do procedimento cirúrgico e substituídos por anticoagulantes de menor meia vida.	Verdadeiro

2- Em relação ao edema cerebral, avalie as afirmativas abaixo:

Questões		Resposta:
A)	o edema cerebral vasogênico é o mais frequente. Ocorre em decorrência do aumento na permeabilidade da barreira hematoencefálica e é caracterizado pelo aumento da permeabilidade do endotélio capilar permitindo o extravasamento de componentes do plasma para o espaço intersticial.	Verdadeiro
B)	quando ocorre insulto isquêmico cerebral, o edema forma-se primariamente na substância branca subcortical e não no córtex cerebral.	Falso
C)	tanto o edema hidrocefálico como o edema linfático, acontecem quando canais de drenagem são bloqueados, resultando na expansão do tecido adjacente à obstrução com acumulação retrógrada de fluido no espaço ocupado pelo fluido extracelular.	Verdadeiro
D)	o edema compressivo, em seu estágio inicial, é caracterizado por aumento do volume de fluido no espaço extracelular, com a quebra da barreira hematoencefálica.	Falso
E)	O edema cerebral osmótico ocorre quando a osmolaridade do plasma é menor do que a osmolaridade do tecido cerebral. Com isso, a água se move acompanhando o gradiente osmótico, reduzindo o conteúdo de água do fluido extracelular cerebral.	Falso

3- Sobre a hipotermia intraoperatória:

Questões		Resposta:
A)	a sudorese é mediada pela inervação adrenérgica.	Falso
B)	a faixa interlimiar de temperatura em pacientes normais é de 0,4°C.	Verdadeiro
C)	a anestesia peridural causa menor redistribuição de calor do que a anestesia geral.	Verdadeiro
D)	a anestesia geral aumenta a perda cutânea de calor de forma significativa.	Falso
E)	a hipotermia intraoperatória aumenta a incidência de taquicardia ventricular.	Verdadeiro

4- São causas de elevação dos níveis de lactato, o uso de:

Questões		Resposta:
A)	linezolida.	Verdadeiro
B)	maconha.	Falso
C)	óxido nitroso.	Falso
D)	inibidores da transcriptase reversa.	Verdadeiro
E)	halotano.	Falso

5- Com relação a anestesia para geriatria, assinale V ou F.

Questões		Resposta:
A)	À medida que o sistema respiratório envelhece, os pulmões tornam-se mais complacentes.	Falso
B)	No idoso, enquanto a capacidade pulmonar total permanece inalterada, o volume residual funcional aumenta de 0,5% a 1% por década, levando a uma diminuição da capacidade vital	Falso
C)	Em idoso com demência, uso de antipsicóticos apresenta risco aumentado de acidentes vasculares encefálicos e mortalidade.	Verdadeiro
D)	Idosos tem a CAM dos anestésicos inalatórios aumentados em relação a adultos.	Falso
E)	Idosos submetidos a CAMs elevadas de anestésicos inalatórios têm maiores taxas de <i>delirium</i> , disfunção cognitiva pós-operatória e náuseas e vômitos pós-operatórios.	Verdadeiro